



**PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 002/2025 – DIVERSAS SECRETARIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE.**

Candidato (a):	Inscrição:
Função: CIRURGIÃO DENTISTA – DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR	
Secretaria:	Data:

FOLHA DE ROSTO ORIENTATIVA PARA PROVA OBJETIVA

LEIA AS ORIENTAÇÕES COM CALMA E ATENÇÃO!

1. INSTRUÇÕES GERAIS

- O candidato receberá do fiscal da sala: um caderno de questões contendo 20 (vinte) questões objetivas de múltipla escolha e uma folha de respostas personalizada para a prova objetiva.
- Preencha o nome, Inscrição, função, secretaria e data na folha de rosto do caderno de questões e assine a folha de respostas, nos campos indicados.
- A totalidade da prova terá a duração de 3h (três horas), incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas da prova objetiva.
- Iniciadas as provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrido 1h (uma hora) de prova, devendo, antes de sair, entregar ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o caderno de questões e a folha de respostas da prova objetiva.
- ✓ A folha de respostas da prova objetiva será o único documento válido para correção.
- Ao terminar a prova o candidato deverá erguer o braço e aguardar autorização do fiscal para devolver o caderno de questões e a folha de respostas.
- Aparelhos eletrônicos, inclusive celular, e relógios, deverão permanecer desligados, dentro das embalagens cedidas e dispostos embaixo das carteiras universitárias ou em local designado pelo fiscal de sala.
- Bolsas e mochilas deverão ser acondicionados em locais indicados pelo fiscal da sala.
- Caso o candidato necessite se ausentar da sala para uso de sanitário, deverá solicitar ao fiscal da sala e deve aguardar autorização.
- O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento de ensino, não podendo permanecer nas dependências deste.

2. INSTRUÇÕES DA PROVA OBJETIVA

- A Folha de Respostas **NÃO** pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- Use caneta transparente de tinta azul ou preta para preenchimento da folha de respostas. Não utilize lápis.
- Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na folha de respostas.

- Para cada questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.

BOA PROVA!

1. Qual fator de risco apresenta a associação mais forte com o desenvolvimento de DTM dolorosa?

- A) Má oclusão dentária
- B) Estresse psicossocial
- C) Hiperplasia condilar
- D) Perda dentária posterior
- E) Nenhuma das alternativas anteriores

2. A hipótese mais aceita para explicar o deslocamento discal é:

- A) Degeneração do ligamento posterior
- B) Espessamento da cápsula articular
- C) Aumento da pressão intra-articular
- D) Alterações na morfologia condilar
- E) Nenhuma das alternativas anteriores

3. O critério diagnóstico de dor miofascial segundo o DC/TMD exige:

- A) Dor espontânea articular
- B) Dor muscular reproduzida por palpação
- C) Desvio mandibular ao abrir a boca
- D) Evidência radiográfica de degeneração
- E) Nenhuma das alternativas anteriores

4. Qual exame de imagem é considerado padrão-ouro para diagnóstico de deslocamento discal?

- A) Radiografia transcraniana
- B) Tomografia computadorizada
- C) Ressonância magnética
- D) Ultrassonografia
- E) Nenhuma das alternativas anteriores

5. O estalido recíproco é classicamente associado a:

- A) Osteoartrite
- B) Deslocamento discal com redução
- C) Sinovite aguda
- D) Fratura condilar
- E) Nenhuma das alternativas anteriores

6. O deslocamento discal sem redução é frequentemente acompanhado de:

- A) Abertura normal da boca
- B) Dor muscular generalizada
- C) Limitação de abertura bucal
- D) Hiper mobilidade mandibular
- E) Nenhuma das alternativas anteriores

7. O exame clínico que mais auxilia no diagnóstico diferencial entre dor de origem odontogênica e DTM é:

- A) Percussão dentária
- B) Palpação muscular
- C) Análise oclusal
- D) Exame radiográfico periapical

E) Nenhuma das alternativas anteriores

8. A principal característica da artralgia da ATM é:

- A) Dor à palpação articular
- B) Ruído articular constante
- C) Limitação funcional indolor
- D) Dor muscular referida
- E) Nenhuma das alternativas anteriores

9. Qual alteração é mais comum em exames de imagem de pacientes com osteoartrite de ATM?

- A) Aplainamento condilar
- B) Hiperplasia do processo coronóide
- C) Deslocamento discal recíproco
- D) Hipoplasia condilar
- E) Nenhuma das alternativas anteriores

10. A infiltração intra-articular de ácido hialurônico é indicada para:

- A) Dor miofascial crônica
- B) Artrite inflamatória aguda
- C) Osteoartrite sintomática
- D) Fratura condilar
- E) Nenhuma das alternativas anteriores

11. O tratamento inicial mais indicado para dor miofascial crônica é:

- A) Cirurgia artroscópica
- B) Placa estabilizadora
- C) Infiltração com corticoide
- D) Reposição discal

E) Nenhuma das alternativas anteriores

12. Em pacientes com bruxismo associado a DTM, o tratamento de primeira linha é:

- A) Antidepressivos tricíclicos
- B) Placa interoclusal rígida
- C) Ortodontia corretiva
- D) Injeções de toxina botulínica
- E) Nenhuma das alternativas anteriores

13. A degeneração progressiva da ATM com destruição óssea em paciente jovem deve levantar suspeita de:

- A) Osteoartrite primária
- B) Artrite reumatoide
- C) Deslocamento discal
- D) Sinovite traumática
- E) Nenhuma das alternativas anteriores

14. A palpação intra-auricular durante abertura e fechamento mandibular auxilia na avaliação de:

- A) Dor muscular
- B) Ruídos articulares
- C) Desgaste dentário
- D) Degeneração condilar
- E) Nenhuma das alternativas anteriores

15. Qual fármaco apresenta maior evidência para o tratamento de dor crônica em DTM?

- A) Benzodiazepínico
- B) AINE
- C) Antidepressivo tricíclico

- D) Corticoide sistêmico
- E) Nenhuma das alternativas anteriores

16. A terapia cognitivo-comportamental é indicada em DTM porque:

- A) Reduz processos degenerativos articulares
- B) Melhora padrões de dor crônica e hábitos parafuncionais
- C) Estimula a regeneração cartilaginosa
- D) Reduz inflamação sinovial
- E) Nenhuma das alternativas anteriores

17. O método mais sensível para avaliar ruídos articulares é:

- A) Auscultação com estetoscópio
- B) Palpação digital
- C) Eletrosonografia
- D) Questionário autorreferido
- E) Nenhuma das alternativas anteriores

18. A principal contraindicação para o uso de placa estabilizadora é:

- A) Bruxismo noturno
- B) Dor miofascial associada
- C) Edentulismo extenso
- D) Osteoartrite
- E) Nenhuma das alternativas anteriores

19. A cirurgia aberta da ATM é indicada quando:

- A) O paciente não tolera placa interoclusal

- B) Há deslocamento discal recapturável

- C) Existe anquilose fibrosa ou óssea
- D) Há dor miofascial persistente

- E) Nenhuma das alternativas anteriores

20. O tratamento de escolha para luxação recidivante da ATM é:

- A) Placa interoclusal
- B) Limitação voluntária de abertura bucal

- C) Procedimentos cirúrgicos de bloqueio mecânico

- D) Uso de AINEs
- E) Nenhuma das alternativas anteriores