



**PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 002/2025 – DIVERSAS SECRETARIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE.**

Candidato (a):	Inscrição:
Função: ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA	
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Data:

FOLHA DE ROSTO ORIENTATIVA PARA PROVA OBJETIVA

LEIA AS ORIENTAÇÕES COM CALMA E ATENÇÃO!

1. INSTRUÇÕES GERAIS

- O candidato receberá do fiscal da sala: um caderno de questões contendo 20 (vinte) questões objetivas de múltipla escolha e uma folha de respostas personalizada para a prova objetiva.
- Preencha o nome, Inscrição, e data na folha de rosto do caderno de questões e assine a folha de respostas, nos campos indicados.
- A totalidade da prova terá a duração de 3h (três horas), incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas da prova objetiva.
- Iniciadas as provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrido 1h (uma hora) de prova, devendo, antes de sair, entregar ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o caderno de questões e a folha de respostas da prova objetiva.
- ✓ A folha de respostas da prova objetiva será o único documento válido para correção.
- Ao terminar a prova o candidato deverá erguer o braço e aguardar autorização do fiscal para devolver o caderno de questões e a folha de respostas.
- Aparelhos eletrônicos, inclusive celular, e relógios, deverão permanecer desligados, dentro das embalagens cedidas e dispostos embaixo das carteiras universitárias ou em local designado pelo fiscal de sala.
- Bolsas e mochilas deverão ser acondicionados em locais indicados pelo fiscal da sala.
- Caso o candidato necessite se ausentar da sala para uso de sanitário, deverá solicitar ao fiscal da sala e deve aguardar autorização.
- O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento de ensino, não podendo permanecer nas dependências deste.

2. INSTRUÇÕES DA PROVA OBJETIVA

- A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- Use caneta transparente de tinta azul ou preta para preenchimento da folha de respostas. Não utilize lápis.
- Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na folha de respostas.

- Para cada questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.

BOA PROVA!

1. As principais complicações relacionadas aos estomas incluem:

- I- A adaptação inadequada da placa de ostomia devido à má localização do estoma na parede abdominal;
- II- Dermatite periostomal;
- III- Necrose isquêmica.

Está correto o que se afirma em:

- A) I, II e III.
- B) I e II, apenas.
- C) II, apenas.
- D) III, apenas.
- E) II e III, apenas.

2. Como manifestações sistêmicas, podem ocorrer distúrbios hidroeletrólíticos, em estomas de alto débito, e anemia, em casos de sangramento de varizes localizadas no estoma. Além das complicações citadas, existe ainda, nos casos de ostomias _____, a morbimortalidade relacionada ao procedimento de fechamento dos mesmos.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto.

- A) temporárias
- B) permanentes
- C) simples
- D) complexas

- E) recentes

3. Sobre a traqueostomia, assinale a alternativa incorreta.

A) É o procedimento cirúrgico que consiste na abertura da parede anterior da traqueia, comunicando-a com o meio externo por meio de uma cânula, possibilitando a permeabilidade da via aérea.

B) Tem como objetivo primário servir como alternativa artificial e segura para a passagem do ar quando existe alguma obstrução nas vias aéreas naturais do paciente.

C) Trata-se de um dos procedimentos mais realizados em unidades de terapia intensiva (UTI) e sua opção é vantajosa em relação à intubação orotraqueal, uma vez que: facilita a alimentação do paciente; facilita a aspiração de secreções da traqueia, bem como a mobilização dessas secreções, trazendo maior conforto; diminui a incidência de pneumonias; facilita o desmame ventilatório; promove o retorno precoce da fala; facilita a respiração, por aumentar o espaço morto e a resistência ao fluxo aéreo.

D) As indicações para a realização da traqueostomia são: permitir ventilação mecânica em intubações

orotraqueais prolongadas (isto é, quando a extubação é improvável entre 10 a 14 dias de intubação orotraqueal); liberar uma obstrução de vias aéreas superiores; permitir higiene pulmonar, incluindo indivíduos com aspiração laringotraqueal; e permitir a ventilação em pacientes com debilidade na musculatura respiratória.

E) Apneia do sono é uma indicação de traqueostomia no adulto.

4. É recomendado que a troca do tubo de traqueostomia seja feita por profissional médico ou fisioterapeuta, sendo a frequência de troca de cânula metálica a cada 30 dias e a frequência de troca da cânula plástica em até:

- A) 5 dias.
- B) 7 dias.
- C) 10 dias.
- D) 12 dias.
- E) 14 dias.

5. A gastrostomia endoscópica percutânea é um método empregado para fornecimento de dieta enteral por tubo colocado no estômago (gastrostomia) por endoscopia (via endoscópica) através da pele (implantação percutânea) para suporte nutricional adequado de pacientes que não conseguem fazer uso adequado de dieta oral por ingesta insuficiente ou por alterações anatômicas no trato gastrointestinal superior ou que necessitem fazer uso de dieta por sonda nasoenteral por

tempo prolongado. As principais indicações da gastrostomia endoscópica são todas as alternativas abaixo, exceto:

- A) Os distúrbios de deglutição secundários a doença de Alzheimer.
- B) Acidente vascular cerebral.
- C) Traumatismo raquimedular.
- D) Neoplasias de cabeça e pescoço.
- E) Neoplasia de esôfago.

6. A pleurostomia aberta tem como objetivo drenar o exsudato acumulado para o tratamento do derrame pleural complicado de difícil manejo, epiemas, entre outras. Esse fenômeno é caracterizado pela deposição de tecido _____ na superfície interior das membranas pleurais, espessamento pleural causando o encarceramento pulmonar, uma vez que a expansão do pulmão torna-se prejudicada.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima.

- A) Epitelial
- B) Conjuntivo
- C) Fibroso
- D) Muscular
- E) liso

7. A perda do controle da eliminação de fezes e gases, causada pela abertura de um estoma intestinal,

constitui fator forte de impacto emocional para as pessoas estomizadas, porque o estoma lhes altera o esquema corporal, a autoimagem e a autoestima, além de determinar outros distúrbios associados a essas. Concernente aos cuidados específicos, a _____ e o sistema oclutor da colostomia são recursos importantes na reabilitação de pessoas colostomizadas, possibilitando-lhes o controle intestinal mais efetivo, com reflexos para a sua qualidade de vida.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima.

- A) irrigação
- B) maturação
- C) antissepsia
- D) limpeza
- E) descontaminação

8. Sobre a retocolite ulcerativa, não é correto afirmar que:

- A) Trata-se de doença que acomete o intestino grosso (cólon e reto).
- B) Caracteriza-se por inflamação da camada superficial do intestino chamada de mucosa.
- C) A doença não tem causa definida, portanto não há tratamento específico para sua cura. No entanto, é passível de controle através de medicamentos.

D) É associada a vários fatores, tendo por base um componente hereditário e imunológico importante.

E) Quando acomete apenas o reto é chamada colite e nesse caso costuma se manifestar por prisão de ventre com sangramento, às vezes confundida com hemorroida pelo paciente.

9. É o agravo mais frequente para a indicação do estoma abdominal definitivo:

- A) Câncer de reto.
- B) Retocolite ulcerativa.
- C) Doença de Crohn.
- D) Câncer de íleo.
- E) Inflamação do jejuno.

10. Os sinais e sintomas mais comumente presentes durante os períodos de atividade da Doença de Crohn são todas as alternativas abaixo, exceto:

- A) Dor: Pessoas diferentes desenvolvem intensidades diferentes de dor. O local também depende da região do TGI afetada. Quando a inflamação ocorre no íleo, as pessoas costumam referir dor na parte inferior direita do abdômen.
- B) Úlceras: O processo inflamatório pode fazer aparecer uma área do TGI que pode sangrar. Usualmente são notadas a partir da presença de sangue nas fezes.
- C) Diarreia: Varia de leve a severa. Pode conter muco, pus ou sangue.

D) Sensação de mal-estar.

E) Aumento do apetite.

11. Um paciente acamado apresenta ferida na região sacral com destruição total da pele e necrose da camada subcutânea. Pelas características, trata-se de uma lesão por pressão

A) estágio 1.

B) estágio 2.

C) estágio 3.

D) estágio 4.

E) não classificável.

12. As feridas epidérmicas envolvem apenas

A) a hipoderme.

B) a epiderme e a derme.

C) o tecido subcutâneo.

D) a hipoderme e a epiderme.

E) a camada superficial da pele.

13. O exsudato, caracterizado por líquido com baixo conteúdo proteico, observado nas fases de desenvolvimento da maioria das reações inflamatórias agudas, é denominado:

A) seroso.

B) fibrinoso.

C) purulento.

D) sanguinolento.

E) seropurulento.

14. Assinale a opção que indica parâmetros usados na escala Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH) para avaliar o processo de cicatrização das lesões por pressão.

A) Coloração da pele e umidade.

B) Profundidade e epiteliação.

C) Quantidade de tecido necrótico e descolamento.

D) Tipo de tecido prevalente e quantidade de exsudato.

E) Cicatrização das bordas e fibrose periférica.

15. Os pacientes com ileostomias e urostomias devem ser orientados a esvaziar as bolsas coletoras sempre que estas atingirem

A) o total de sua capacidade.

B) 1/2 de sua capacidade total.

C) 1/4 de sua capacidade total.

D) 2/3 de sua capacidade total.

E) 1/3 de sua capacidade total.

16. Quando uma incisão cirúrgica é suturada ocorre o (a)

A) fechamento atrófico.

B) fechamento secundário.

C) cicatrização por primeira intenção.

D) cicatrização por segunda intenção.

E) cicatrização por terceira intenção.

17. Um paciente vítima de queimadura apresenta lesões bolhosas, dolorosas, com superfície rosada e comprometimento de toda epiderme até porções superficiais da

derme. Essas são características da queimadura de:

- A) primeiro grau.
- B) segundo grau.
- C) terceiro grau.
- D) quarto grau.
- E) quinto grau.

- A) hidrogel amorfo.
- B) tela de petrolatum.
- C) carvão ativado com prata.
- D) ácidos graxos essenciais.
- E) placas de hidrocoloide.

18: Um adulto apresenta-se com queimadura em toda a extensão do tronco anterior e dos membros superiores. Assinale a opção que indica o percentual de área corporal queimada.

- A) 15%.
- B) 18%.
- C) 27%.
- D) 36%.
- E) 45%.

19. Assinale a opção que apresenta uma das características definidoras do diagnóstico de enfermagem “integridade da pele prejudicada”.

- A) umidade da pele.
- B) imobilização física.
- C) circulação prejudicada.
- D) deficiência imunológica.
- E) destruição de camadas da pele.

20. Entre as coberturas listadas a seguir, assinale a mais indicada para o tratamento de feridas fétidas, infectadas e exsudativas.