



**PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 002/2025 – DIVERSAS SECRETARIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE.**

Candidato (a):	Inscrição:
Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	
Secretaria:	Data:

FOLHA DE ROSTO ORIENTATIVA PARA PROVA OBJETIVA

LEIA AS ORIENTAÇÕES COM CALMA E ATENÇÃO!

1. INSTRUÇÕES GERAIS

- O candidato receberá do fiscal da sala: um caderno de questões contendo 20 (vinte) questões objetivas de múltipla escolha e uma folha de respostas personalizada para a prova objetiva.
- Preencha o nome, Inscrição, função, secretaria e data na folha de rosto do caderno de questões e assine a folha de respostas, nos campos indicados.
- A totalidade da prova terá a duração de 3h (três horas), incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas da prova objetiva.
- Iniciadas as provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrido 1h (uma hora) de prova, devendo, antes de sair, entregar ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o caderno de questões e a folha de respostas da prova objetiva.
- ✓ A folha de respostas da prova objetiva será o único documento válido para correção.
- Ao terminar a prova o candidato deverá erguer o braço e aguardar autorização do fiscal para devolver o caderno de questões e a folha de respostas.
- Aparelhos eletrônicos, inclusive celular, e relógios, deverão permanecer desligados, dentro das embalagens cedidas e dispostos embaixo das carteiras universitárias ou em local designado pelo fiscal de sala.
- Bolsas e mochilas deverão ser acondicionados em locais indicados pelo fiscal da sala.
- Caso o candidato necessite se ausentar da sala para uso de sanitário, deverá solicitar ao fiscal da sala e deve aguardar autorização.
- O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento de ensino, não podendo permanecer nas dependências deste.

2. INSTRUÇÕES DA PROVA OBJETIVA

- A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- Use caneta transparente de tinta azul ou preta para preenchimento da folha de respostas. Não utilize lápis.
- Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na folha de respostas.

- Para cada questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.

BOA PROVA!

1. Um dos pilares fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS) é a integralidade, que visa garantir que todas as necessidades de saúde de uma pessoa sejam abordadas em diferentes níveis de atenção, desde a prevenção até o tratamento e a reabilitação. Entretanto, na prática, o princípio da integralidade enfrenta desafios como a fragmentação dos serviços de saúde e a falta de articulação entre os níveis de atenção. Considerando o princípio da integralidade no SUS, assinale a afirmativa que corretamente aborda como tal princípio deve ser implementado.

- A) É restrito ao nível primário de atenção, pois a alta complexidade não está prevista no SUS.
- B) Prevê que as ações de saúde devem focar exclusivamente na cura de doenças e não na promoção da saúde.
- C) A integralidade pode ser garantida por meio de ações isoladas dos profissionais de saúde, sem necessidade de articulação entre equipes.
- D) A integralidade implica que o paciente seja acompanhado em todos os níveis de atenção, conforme suas necessidades, com a articulação entre os serviços de saúde.
- E) Nenhuma das alternativas anteriores.

2. A equidade é um princípio essencial do Sistema Único de Saúde (SUS), que busca garantir que os serviços de

saúde atendam às necessidades específicas de diferentes grupos populacionais, como populações vulneráveis, indígenas e pessoas com

deficiência. Esse princípio implica a adoção de políticas que promovam o tratamento desigual dos desiguais, ou seja, que ofereçam mais recursos e atenção para aqueles que mais necessitam. Em relação à equidade no SUS, qual das opções reflete corretamente a aplicação desse princípio?

- A) Reduzir o acesso de grupos específicos para equilibrar a oferta de serviços de saúde.
- B) Focar exclusivamente na ampliação da rede privada para diminuir a demanda sobre o SUS.
- C) Oferecer o mesmo nível de atenção e recursos para todas as pessoas, sem considerar suas particularidades.
- D) Implementar políticas que priorizem o atendimento a grupos de baixa renda, comunidades rurais e populações vulneráveis.
- E) Nenhuma das alternativas anteriores.

3. Qual das alternativas a seguir configura infração ética segundo o Código de Ética da Enfermagem?

- a) Garantir privacidade ao paciente durante o atendimento.

- b) Atualizar-se continuamente para qualificar a assistência.
- c) Abandonar paciente sob sua responsabilidade.
- d) Participar de decisões multiprofissionais sobre o cuidado.
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

4. O intestino delgado é um tubo muscular de cerca de 5 a 6 metros responsável pela absorção dos alimentos. A segunda porção do intestino delgado é o:

- A) íleo.
- B) duodeno.
- C) jejuno.
- D) colón ascendente.
- E) Nenhuma das alternativas anteriores.

5. O processo de defesa do corpo, por meio do sistema imunológico, é chamado de resposta imune. As vacinas fazem parte da imunidade:

- A) não específica.
- B) ativa adquirida.
- C) passiva adquirida.
- D) ativa natural.
- E) passiva artificial.

6. Considerando as disposições acerca das normas e procedimentos para vacinação em crianças, analise as afirmativas a seguir a assinalar (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

() A vacina da febre amarela é contraindicada para crianças menores de 6 meses de idade.

() De acordo com o Ministério da Saúde, o intervalo mínimo entre as doses da vacina Pfizer contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos, deve ser de 2 semanas.

() A idade mínima para a administração da primeira dose da vacina Rotavírus Humano (VRH) é de 1 mês e a idade máxima é de 3 meses e 15 dias. As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- (A) F – F – F.
- (B) V – F – V.
- (C) V – F – F.
- (D) F – F – V.
- (E) V – V – V.

7. Entre as medidas para evitar a contaminação e a disseminação pela Covid-19 e outros microorganismos, está a paramentação e desparamentação dos EPIs de forma correta. No caso de procedimentos geradores de aerossóis, a ordem correta para desparamentação é

A) luvas, avental, gorro, óculos de proteção e máscara.

B) avental, máscara, óculos de proteção, gorro e luvas.

C) óculos de proteção, avental, gorro, luvas e máscara.

D) gorro, avental, máscara, luvas e óculos de proteção.

E) Nenhuma das alternativas anteriores.

8. Alguns medicamentos são comumente utilizados para realizar diluição de medicamentos. Assinale a alternativa INCORRETA, referente aos veículos de diluição de medicamentos:

- A) Soro fisiológico a 0,9%.
- B) Água para injeção.
- C) Soro fisiológico a 20%.
- D) Soluções de glicose a 5%.
- E) Nenhuma das alternativas anteriores.

9. A ferida pode apresentar conteúdo bacteriano, sendo caracterizada em diferentes formas. Assinale a alternativa INCORRETA, quanto a essas formas:

- A) Contaminada: lesão com tempo superior a 6 horas entre o trauma e atendimento, com presença de contaminante mas sem processo infeccioso local.
- B) Limpa contaminada: lesão feita em condições assépticas e que está isenta de microrganismos.
- C) Infectada: presença de agente infeccioso local e lesão com evidência de intensa reação inflamatória e destruição de tecidos, podendo haver pus.
- D) Odor: produzido por bactérias e tecidos em decomposição.
- E) Nenhuma das alternativas anteriores.

10. A Atenção Primária à Saúde (APS) é o primeiro nível de atenção em saúde e se caracteriza por um

conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo. São serviços de atenção primária à saúde, EXCETO:

- A) Programa saúde na escola.
- B) Estratégia de Saúde da Família.
- C) Programa Mais Médicos; Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares.
- D) Rede de Bancos de Leite Humano; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192); Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h); Política Nacional de Humanização.
- E) Nenhuma das alternativas anteriores.

11. Segundo a Lei nº. 7.498, de 25 de junho de 1986, a enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício. Sendo exercida privativamente pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação. Assim, de acordo com a referida lei, são atividades exercidas pelo Técnico de Enfermagem, com exceção de:

- A) Participar da programação da assistência de enfermagem.
- B) Assistência à parturiente e ao parto normal.
- C) Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.
- D) Participar da equipe de saúde

E) Nenhuma das alternativas anteriores.

12. A execução de ações de vigilância sanitária; de vigilância epidemiológica; de saúde do trabalhador; de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica e; de saúde bucal estão incluídas no campo de atuação do (a):

- A) Conselho de Saúde.
- B) Rede de Atenção à Saúde.
- C) Núcleo de Apoio à Saúde da Família.
- D) Sistema Único de Saúde (SUS).
- E) Nenhuma das alternativas anteriores.

13. Ao administrar qualquer medicamento para um paciente, o profissional da área da saúde, incluindo-se o de enfermagem, tem como objetivo primordial alcançar os efeitos terapêuticos desejados provocando o mínimo de efeitos colaterais. Assim, considerando as vias de administração de medicamentos, associe adequadamente as colunas a seguir, e assinale a alternativa que apresente a sequência correta:

- 1- Via oral.
- 2- Via sublingual.
- 3- Via retal.
- 4- Via subcutânea.
- 5- Via transdérmica.

() Via utilizada quando o paciente não apresenta condições de deglutir fármacos ou em casos nos quais é

necessário que o medicamento não tenha contato com a circulação ou com o suco gástrico.

() Consiste em oferecer o medicamento que será deglutido ou não com auxílio de líquidos.

() Utilizada para administrar medicamento por meio da pele com o uso de adesivos. Esses medicamentos podem ter ação local ou sistêmica.

() Utilizada para administração de insulina, anticoagulantes, algumas vacinas, adrenalina e hormônios.

() Consiste em administrar o medicamento diretamente sob a língua e deixar que sua absorção seja realizada pela mucosa oral.

A) 3, 1, 4, 5, 2.

B) 3, 1, 5, 4, 2.

C) 4, 1, 5, 3, 2.

D) 5, 1, 4, 3, 2.

E) 4, 3, 5, 1, 2

14. No atendimento a emergências psiquiátricas e prestação de primeiros socorros, são necessárias condutas específicas para garantir a segurança do paciente e do ambiente. Nesses contextos, a melhor prática de intervenção é:

A) aplicar contenção física de imediato, sem necessidade de comunicação ou avaliação prévia com o paciente.

B) priorizar o uso de medicamentos sedativos em todos os casos de crise psiquiátrica, independentemente do quadro apresentado.

C) usar estratégias eficazes de comunicação, como escuta ativa e

abordagem empática, para desescalar comportamentos agressivos ou agitados.

D) isolar o paciente em ambiente controlado imediatamente após sinais de agitação, mesmo se ele não apresentar risco iminente.

E) Nenhuma das alternativas anteriores.

15. Em 2024, o Ministério da Saúde começou a disponibilizar a vacina contra a dengue na rede pública de saúde. Acerca dessa vacina, assinale a afirmativa correta.

A) O esquema vacinal é composto por 3 doses.

B) A dose recomendada é de 0,5 mL, por via subcutânea.

C) O intervalo mínimo recomendado entre as doses é de 60 dias.

D) Em caso de diagnóstico de dengue, deve-se esperar 4 meses para iniciar o esquema vacinal.

E) Nenhuma das alternativas anteriores.

16. Na assistência a uma criança com diarreia é importante que o profissional de enfermagem seja capaz de reconhecer os sinais de desidratação ou desidratação grave. Nesse sentido, assinale a opção que indica um sinal de desidratação grave.

A) Letargia.

B) Irritação.

C) Boca úmida.

D) Sede intensa.

E) Nenhuma das alternativas anteriores.

17. Em novembro de 2024, o Brasil recebeu da Organização PanAmericana da Saúde (Opas/OMS) a recertificação de país livre do sarampo. Isso só foi possível devido à intensificação das ações de vacinação pelo Ministério da Saúde. Assinale a opção que indica o esquema vacinal contra o sarampo.

A) Uma dose da vacina tríplice viral para pessoas de 12 meses a 29 anos, com reforço a cada 10 anos.

B) Duas doses da vacina DTP para crianças de 15 meses a 4 anos e um reforço aos 12 anos.

C) Duas doses da vacina tríplice viral para pessoas de 12 meses a 29 anos e dose única para adultos de 30 a 59 anos.

D) Uma dose da vacina DTP para crianças de 12 meses a 29 anos e dose única para adultos de 20 a 45 anos.

E) Duas doses da vacina tetraviral para crianças de 15 meses a 2 anos e dose única para adultos a partir dos 25 anos.

18. De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde, assinale a alternativa incorreta.

A) A vacina pneumocócica 23 valente somente deverá ser feita na ausência de histórico vacinal com qualquer vacina pneumocócica conjugada

B) A vacina HPV 4 - recombinante está indicada no SUS, como duas doses, para crianças e adolescentes não vacinados, na faixa etária de 09 a 14 anos e intervalo de dois meses entre as doses

C) A vacina Sarampo, caxumba, rubéola (SCRV - atenuada) poderá ser utilizada em substituição à vacina varicela (atenuada) na indisponibilidade deste imunobiológico, em crianças a partir dos 4 anos de idade vacinadas com pelo menos uma dose da vacina tríplice viral

D) A vacina Hepatite A inativada é aplicada em única dose aos 15 meses

E) Nenhuma das alternativas anteriores.

19. De acordo com a Instrução Normativa do Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde (2024), qual vacina é ofertada de forma gratuita e rotineira pelo SUS para o público alvo especificado?

A) Hepatite A, aos 6 (seis) anos de idade, para todas as crianças.

B) Vacina VSR (vírus sincicial respiratório), para as gestantes.

C) Pneumocócica 23-valente, aos 2 (dois), 4 (quatro) e 12 (doze) meses de idade, para todas as crianças.

D) Meningocócica B, aos 3 (três), 5 (cinco) e 12 (doze) meses de idade.

E) Vacina inativada poliomielite (VIP), aos 2 (dois), 4 (quatro), 6 (seis) e 15 (quinze) meses de idade.

20. Ao prestar assistência a um paciente idoso acamado durante a

visita domiciliar, o técnico de enfermagem identificou que o idoso tinha risco de desenvolver lesão por pressão (LPP). Um cuidado recomendado para prevenção das LPP é:

A) proteger a pele da exposição à umidade excessiva.

B) massagear, vigorosamente, as áreas de proeminência óssea e hiperemiadas para que a circulação seja estimulada,

C) evitar o uso de hidratantes, mesmo que a pele esteja ressecada,

D) limpar a pele apenas quando estiver suja para diminuir o ressecamento.

E) nenhuma das alternativas anteriores.